



Ordonnance collective

N° : OC-SESM-08

Administration de lidocaïne ou lidocaine avec épinéphrine en contexte de fermeture de plaies non chirurgicales à l'aide de sutures et d'agrafes

Établissement : Santé Expert Services Médicaux

Numéro de cette ordonnance collective : OC-SESM-08

Période de validité : Octobre 2025 à octobre 2026

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE

Toutes les personnes ayant une plaie traumatique non chirurgicale de moins de 12h qui nécessite des sutures ou des agrafes et un suivi nécessitant une prescription de retrait de sutures ou d'agrafes.

INDICATIONS CLINIQUES

Anesthésie cutanée locale de lidocaïne 1% ou 2% avec ou sans épinéphrine en prévention de la douleur occasionnée par la fermeture de plaie non chirurgicale à l'aide de sutures et d'agrafes.

PROFESSIONNELS OU PERSONNES HABILITÉS VISÉS PAR CETTE ORDONNANCE¹

Les infirmières de l'ensemble des cliniques Santé Expert Services Médicaux qui possèdent la compétence professionnelle requise à l'exécution du geste technique, c'est-à-dire les connaissances scientifiques, les habiletés et le jugement clinique inhérents à l'activité exercée selon les normes de pratique en vigueur.

ACTIVITÉS RÉSERVÉES

Infirmière :

- Évaluation de la condition physique ou mentale d'une personne symptomatique ;
- Détermination et application du plan de traitement des plaies ;
- Utilisation de techniques invasives et administration de médicaments selon ordonnance collective ;
- Surveillance clinique et ajustement du plan thérapeutique infirmier ;
- La vaccination et l'évaluation du statut vaccinal selon la Loi sur la Santé publique.

IPSPL RÉPONDANT

IPSPL hors RAMQ désignée selon le fonctionnement de Santé Expert Services Médicaux.

CONTRE-INDICATIONS À L'APPLICATION DE CETTE ORDONNANCE

- Analgésique de lidocaïne combiné à épinéphrine chez les enfants de moins de 6 mois
- Plaie chirurgicale
- Allergie à la lidocaïne, à l'épinéphrine ou à une composante ou un dérivé de ces produits
- Morsure d'humain ou d'animal
- Blessure au niveau des oreilles, paupières, nez, lèvres, bouche, organes génitaux

¹ Le professionnel ou la personne habilitée doit assurer d'avoir les compétences nécessaires afin d'exécuter cette ordonnance (ex. : formation).



Ordonnance collective

N° : OC-SESM-08

Administration de lidocaïne ou lidocaïne avec épinéphrine en contexte de fermeture de plaies non chirurgicales à l'aide de sutures et d'agrafes

ENSEIGNEMENT ET INTERVENTIONS PRÉVENTIVES

Se référer à l'Outil d'aide à la décision de Janvier 2024 de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux *Soins de plaies Plaie traumatique (lacération, abrasion, morsure)*
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Usage_optimal/Soins_de_plaie_traumatiqe_VF.pdf

RÉFÉRENCE A UN MÉDECIN OU IPSPL SANTÉ EXPERT

Situation nécessitant l'avis médical d'un médecin ou d'une IPS:

- Blessure profonde
- Signes d'infection
- Structures sous-jacentes visibles
- Déficit tissulaire important
- Fracture ou blessure par écrasement
- Plus de 12h depuis la blessure
- Déficit neurovasculaire
- Plaie complexe (avec corps étranger logé)

OUTILS DE RÉFÉRENCE ET SOURCES

Protocole national du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale PRO-2018-28r01-Initier l'application de lidocaïne 4 % liposomale pour anesthésie cutanée lors de procédure douloureuse chez l'enfant et l'adulte.

Ordonnance collective du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale OC-2018-28r01 Initier l'application de lidocaïne 4% liposomale pour anesthésie cutanée lors de procédure douloureuse chez l'enfant et l'adulte.

Formation théorique et pratique *Fermeture de plaies non chirurgicales à l'aide de sutures et d'agrafes* donnée par M. Pierre Verret, Faculté des Sciences infirmières, Université Laval, automne 2025.

Outil d'aide à la décision de Janvier 2024 de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux *Soins de plaies Plaie traumatique (lacération, abrasion, morsure)*.

DOCUMENTATION

Remplir le Questionnaire et consentement pour l'OC Administration de lidocaïne ou lidocaïne avec épinéphrine en contexte de fermeture de plaies non chirurgicales à l'aide de sutures et d'agrafes (OC-SESM-08).

Remplir le document Évaluation infirmière pour l'OC-SESM-08.

Remettre le formulaire de référence pour consultation médicale pour le retrait de points de sutures ou d'agrafes selon le cas.

Remettre le formulaire de référence pour consultation médicale si présence de contre-indications à la procédure de fermeture de plaies non chirurgicales à l'aide de sutures ou d'agrafes ou à l'OC-SESM-08.



Ordonnance collective

N° : OC-SESM-08

Administration de lidocaïne ou lidocaïne avec
épinéphrine en contexte de fermeture de plaies non
chirurgicales à l'aide de sutures et d'agrafes


PROCESSUS DE MISE EN VIGUEUR

1. ÉLABORATION DE LA VERSION ACTUELLE

Laurie Rowley-Dallaire, inf. clin. 2233183 et Juliette St-Michel-Verreault, inf. clin. 2232555

2. VALIDATION DE LA VERSION ACTUELLE (Brooke Latulippe IPSPL, 812173, OIIQ 2134561)

3. APPROBATION DE LA VERSION ACTUELLE PAR LES PRESCRIPTEURS SIGNATAIRES (HORS ÉTABLISSEMENT)

Nom et prénom	Numéro de permis	Signature	Téléphone	Télécopieur
Latulippe, Brooke	RAMQ 812173 OIIQ2134561		418-781-9963	418-781- 6036

4. Révision

Date d'entrée en vigueur : Octobre 2025

Date de la dernière révision (s'il y a lieu) : -

Date prévue de la prochaine révision : Octobre 2026